Lycopodiella inundata – plavuňka zaplavovaná

Plavuňka zaplavovaná je oceánicky laděný druh s hlavním rozšířením ve střední a západní Evropě a na východě severní Ameriky. Na Šumavě byla zaznamenána roztroušeně až vzácně v sz. části české a bavorské Šumavy, v jv. části Šumavy je velmi vzácná a v rakouské části Šumavy chybí. Plavuňka preferuje vlhké rašelinné nebo minerální půdy především v iniciálních stádiích sukcese, tedy na místech s ne zcela zapojenou bylinnou vegetací. Výskyty na sukcesně stárnoucích plochách po čase zanikají, avšak v případě vhodných disturbancí se může rychle šířit na ekologicky vhodná stanoviště v okolí. Na Šumavě plavuňka zaplavovaná roste nebo v minulosti rostla na slatích, okrajích rašelinišť, jezer, v terénních depresích bývalých tankových střelnic, na průsecích po hraničních zátarasech, v pískovnách, zemnících, kde snáší i krátkodobé zaplavení.

Velká část lokalit známých v minulosti zanikla a dokonce v 80. letech 20. století byl druh řazen mezi nezvěstné druhy Šumavy (Sendtner 1860, Moravec 1963; Procházka 1965, Pavlíčko & Procházka 1998). V současné době plavuňka zaplavovaná roste na české straně Šumavy zřejmě asi jen na 9 lokalitách vždy druhotného charakteru: dno opuštěného lomu u bývalé obce Zhůří u Nové Hůrky, při okraji lesní cesty u Rybárny nedaleko Modravy, při okraji cesty na Javorníku u Stach, v písníku v prostoru bývalé střelnice u Kvildy, na bývalém vojenském cvičišti Radost u Klášterce, zarůstající lesní cesta v bývalé obci Stodůlky, bývalá obec Horní Světlé Hory, pískovna v Novém Údolí, rašelinný okraj lesní cesty severně od bývalé obce Jasánky (podrobný přehled lokalit viz Kaplan et al. 2019). V bavorské části Šumavy je dnes známa z plovoucích ostrůvků Malého Javorského jezera (Horn & Diewald 2005) a na rašelinných prameništích v údolí potoka Kleiner Schwarzbach severovýchodně od Luzného + please other add W. Diewald.

Lycopodiella inundata – Sumpf-Bärlapp, Gewöhnlicher Sumpf-Bärlapp

Plavuňka zaplavovaná je oceánicky laděný druh s hlavním rozšířením ve střední a západní Evropě a na východě severní Ameriky. Na Šumavě byla zaznamenána roztroušeně až vzácně v sz. části české a bavorské Šumavy, v jv. části Šumavy je velmi vzácná a v rakouské části Šumavy chybí. Plavuňka preferuje vlhké rašelinné nebo minerální půdy především v iniciálních stádiích sukcese, tedy na místech s ne zcela zapojenou bylinnou vegetací. Výskyty na sukcesně stárnoucích plochách po čase zanikají, avšak v případě vhodných disturbancí se může rychle šířit na ekologicky vhodná stanoviště v okolí. Na Šumavě plavuňka zaplavovaná roste nebo v minulosti rostla na slatích, okrajích rašelinišť, jezer, v terénních depresích bývalých tankových střelnic, na průsecích po hraničních zátarasech, v pískovnách, zemnících, kde snáší i krátkodobé zaplavení.

Velká část lokalit známých v minulosti zanikla a dokonce v 80. letech 20. století byl druh řazen mezi nezvěstné druhy Šumavy (Sendtner 1860, Moravec 1963; Procházka 1965, Pavlíčko & Procházka 1998). V současné době plavuňka zaplavovaná roste na české straně Šumavy zřejmě asi jen na 9 lokalitách vždy druhotného charakteru: dno opuštěného lomu u bývalé obce Zhůří u Nové Hůrky, při okraji lesní cesty u Rybárny nedaleko Modravy, při okraji cesty na Javorníku u Stach, v písníku v prostoru bývalé střelnice u Kvildy, na bývalém vojenském cvičišti Radost u Klášterce, zarůstající lesní cesta v bývalé obci Stodůlky, bývalá obec Horní Světlé Hory, pískovna v Novém Údolí, rašelinný okraj lesní cesty severně od bývalé obce Jasánky (podrobný přehled lokalit viz Kaplan et al. 2019). V bavorské části Šumavy je dnes známa z plovoucích ostrůvků Malého Javorského jezera (Horn & Diewald 2005) a na rašelinných prameništích v údolí potoka Kleiner Schwarzbach severovýchodně od Luzného + please other add W. Diewald.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

CR (Critically Endangered/Kriticky ohrožené/Vom Aussterben bedroht) [B2b(iii+iv)+c(iv)]


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Lycopodiella inundata* – Libor Ekrt – Klášterec.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Lycopodiella inundata* – Libor Ekrt – Klášterec.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Lycopodiella inundata* – Libor Ekrt – Nové Údolí.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Lycopodiella inundata* – Milan Štech – Kleiner Arbersee.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Lycopodiella inundata* – Milan Štech – Kleiner Schwarzbach.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Lycopodiella inundata* – Petr Koutecký – Moorberg.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY