Pteridium aquilinum – hasivka orličí

Hasivka orličí je vytrvalým expanzně se šířícím kosmopolitně rozšířeným druhem. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně až místy hojně v nižších a středních polohách. Častý výskyt hasivky orličí byl pozorován zpravidla v říčních údolích Otavy, Vydry, Křemelné, Studené Vltavy, Losenice, Úhlavy. Naopak do vyšších poloh zasahuje jen okrajově a v centrálních partiích Šumavských plání je velmi vzácná až chybí stejně jako v prostoru mezi obcemi Strážný, České Žleby a Lenora na české straně a obcemi Finsterau, Annathal na německé straně Šumavy. Jedná se o významný rychle rostoucí druh tvořící často rozsáhlé porosty ve světlých acidofilních lesích, lesních okrajích, na mezích, na světlinách podél toků a komunikací a na neobhospodařovaném bezlesí. S větší četností se může vyskytovat v prostoru bývalých obcí na historických pastvinách a v podrostu náletových dřevin. Porosty hasivky orličí bývají převážně sterilní, pouze ojediněle byly v území zaznamenány fertilní porosty a to u obcí Hojsova Stráž, Železná Ruda, Kašperské Hory, Srní, Pernek a Loučovice (Ekrt & Podroužek in Kaplan et al. 2018). Populace hasivky orličí bývají v Evropě převážně diploidní, pouze vzácně se mohou vyskytovat populace triploidní nebo směsné. Na Šumavě byl zaznamenán výskyt triploidních rostlin zatím pouze v údolí Vltavy u Loučovic (Ekrt et al. 2021).

Nejvyšší výskyt: 1350 m n. m.

Pteridium aquilinum – Gewöhnlicher Adlerfarn

Hasivka orličí je vytrvalým expanzně se šířícím kosmopolitně rozšířeným druhem. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně až místy hojně v nižších a středních polohách. Častý výskyt hasivky orličí byl pozorován zpravidla v říčních údolích Otavy, Vydry, Křemelné, Studené Vltavy, Losenice, Úhlavy. Naopak do vyšších poloh zasahuje jen okrajově a v centrálních partiích Šumavských plání je velmi vzácná až chybí stejně jako v prostoru mezi obcemi Strážný, České Žleby a Lenora na české straně a obcemi Finsterau, Annathal na německé straně Šumavy. Jedná se o významný rychle rostoucí druh tvořící často rozsáhlé porosty ve světlých acidofilních lesích, lesních okrajích, na mezích, na světlinách podél toků a komunikací a na neobhospodařovaném bezlesí. S větší četností se může vyskytovat v prostoru bývalých obcí na historických pastvinách a v podrostu náletových dřevin. Porosty hasivky orličí bývají převážně sterilní, pouze ojediněle byly v území zaznamenány fertilní porosty a to u obcí Hojsova Stráž, Železná Ruda, Kašperské Hory, Srní, Pernek a Loučovice (Ekrt & Podroužek in Kaplan et al. 2018). Populace hasivky orličí bývají v Evropě převážně diploidní, pouze vzácně se mohou vyskytovat populace triploidní nebo směsné. Na Šumavě byl zaznamenán výskyt triploidních rostlin zatím pouze v údolí Vltavy u Loučovic (Ekrt et al. 2021).

Nejvyšší výskyt: 1350 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Pteridium aquilinum* – Libor Ekrt – Paště.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Pteridium aquilinum* – Libor Ekrt – Paště.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY