Ranunculus lanuginosus – pryskyřník kosmatý

Nápadně velkokvětý pryskyřník s malým středoevropským areálem, který je poměrně náročný na živiny. Vyhledává zejména stinná stanoviště ve vlhkých lesích. Typický je pro okraje lesních potůčků, suťové lesy a květnaté bučiny. Na Šumavě roste roztroušeně se zřetelně četnějším výskytem v oblastech s bohatšími substráty a zachovalejšími lesy jako je například Želnavská a Boubínsko-stožecká hornatina, Královský hvozd a oblast mezi Luzným a Bayerisch Eisenstein na bavorské straně Šumavy.

Ranunculus lanuginosus – Wolliger Hahnenfuß

Ein auffallend großblütiger Hahnenfuß mit einem kleinen mitteleuropäischen Areal, der ziemlich nährstoffanspruchsvoll ist. Er sucht sich besonders schattige Standorte in Feuchtwäldern aus. Typisch ist er für die Ränder von Waldbächen, Schuttwälder und blütenreiche Buchenwälder. Im Böhmerwald wächst er zerstreut mit einem deutlich häufigeren Vorkommen in den Gebieten mit reicheren Substraten und mehr erhaltenen Wäldern, wie z. B. die Bergländer Želnavská hornatina und Boubínsko-stožecká hornatina, das Künische Gebirge und das Gebiet zwischen dem Lusen und Bayerisch Eisenstein auf bayerischer Seite des Böhmerwaldes.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Ranunculus lanuginosus* – Libor Ekrt – Stožec.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY