Serratula tinctoria – srpice barvířská

Srpice barvířská roste nejčastěji na střídavě vlhkých loukách a ve světlých střídavě vlhkých a teplomilných doubravách. Srpice je temperátní evropský druh, který se většinou vyhýbá horám a také na Šumavě byla zaznamenána pouze ojediněle na okraji území, a to na severním okraji v oblasti Javorníku u Strašína (Procházka & Vaněček 1969) a na loukách západně od Lhoty pod Kůstrým (Skalický 1993) a dále na východě ve VVP Boletice u bývalých Vitěšovic (Vydrová in NDOP 2003). V bavorské a rakouské části Šumavy neroste.

Serratula tinctoria – Färber-Scharte

Srpice barvířská roste nejčastěji na střídavě vlhkých loukách a ve světlých střídavě vlhkých a teplomilných doubravách. Srpice je temperátní evropský druh, který se většinou vyhýbá horám a také na Šumavě byla zaznamenána pouze ojediněle na okraji území, a to na severním okraji v oblasti Javorníku u Strašína (Procházka & Vaněček 1969) a na loukách západně od Lhoty pod Kůstrým (Skalický 1993) a dále na východě ve VVP Boletice u bývalých Vitěšovic (Vydrová in NDOP 2003). V bavorské a rakouské části Šumavy neroste.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NT (Near Threatened/Blízké ohrožení/Potenziell gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Serratula tinctoria* – Alena Vydrová – Boletice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Serratula tinctoria* – Alena Vydrová – Boletice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Serratula tinctoria* – Alena Vydrová – Boletice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY