Streptopus amplexifolius – čípek objímavý

Cirkumboreální druh s ostrůvkovitým areálem. V Evropě roste v horských oblastech od severního Španělska po Balkán, na sever do středního Německa. V Asii roste v Tibetu, v severní Číně, na Dálném východě až po Kamčatku a v Japonsku. V Severní Americe od Aljašky po Pensylvánii, a také na jihozápadě Grónska. Ve střední Evropě má výrazně ostrůvkovitý výskyt, převažuje v horských polohách, vzácně roste na inverzních stanovištích. Na Šumavě patří k roztroušeným až vzácným druhům. Byl zaznamenán v pohraničním hřebeni od Železné Rudy po Knížecí Pláně, nejmíže sestupuje k Čeňkově Pile. Také byl zjištěn v masivu Boubína. Na bavorské straně roste rovněž v nejvyšších polohách v masivu Javoru, Falkensteinu, Roklanu a Luzného, na jihovýchodě pohoří na česko-bavorsko-rakouském kontaktu na hřebeni od Třístoličníku po Smrčinu, nejdále roste u Ulrichsbergu. Čípek najdeme především v horských smrčinách a podél potoků, především na humózních místech s dostatkem živin. Recentní šumavské populace jsou většinou velmi málo početné; rostliny jsou intenzivně okusovány spárkatou zvěří a většinou nedospějí do plodu.

Streptopus amplexifolius – Stängelumfassender Knotenfuß

Cirkumboreální druh s ostrůvkovitým areálem. V Evropě roste v horských oblastech od severního Španělska po Balkán, na sever do středního Německa. V Asii roste v Tibetu, v severní Číně, na Dálném východě až po Kamčatku a v Japonsku. V Severní Americe od Aljašky po Pensylvánii, a také na jihozápadě Grónska. Ve střední Evropě má výrazně ostrůvkovitý výskyt, převažuje v horských polohách, vzácně roste na inverzních stanovištích. Na Šumavě patří k roztroušeným až vzácným druhům. Byl zaznamenán v pohraničním hřebeni od Železné Rudy po Knížecí Pláně, nejmíže sestupuje k Čeňkově Pile. Také byl zjištěn v masivu Boubína. Na bavorské straně roste rovněž v nejvyšších polohách v masivu Javoru, Falkensteinu, Roklanu a Luzného, na jihovýchodě pohoří na česko-bavorsko-rakouském kontaktu na hřebeni od Třístoličníku po Smrčinu, nejdále roste u Ulrichsbergu. Čípek najdeme především v horských smrčinách a podél potoků, především na humózních místech s dostatkem živin. Recentní šumavské populace jsou většinou velmi málo početné; rostliny jsou intenzivně okusovány spárkatou zvěří a většinou nedospějí do plodu.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

VU (Vulnerable/Zranitelné/Gefährdet) [C2a(i)]

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
KVĚTENA ŠUMAVY
FLORA DES BÖHMERWALDES

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Streptopus amplexifolius* – Libor Ekrt – Plešné jezero.**

***Streptopus amplexifolius* – Alena Vydrová – Smrčina.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Streptopus amplexifolius* – Petr Koutecký – Lusen.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Streptopus amplexifolius* – Petr Koutecký – Lusen.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY