Myosotis ramosissima – pomněnka chlumní

Tato jednoletá pomněnka je rozšířena v Evropě, kromě nejsevernějších oblastí. Na východ zasahuje až po Ural a Kavkaz a na jih až do severní Afriky. Roste především v suchých nezapojených trávnících a na jiných suchých biotopech s řídkou vegetací. Těžiště rozšíření má v teplejších oblastech (Štěpánková 2000, Anonymus 2021, FloraWeb 2021). Na české straně Šumavy existuje o jejím výskytu pouze několik ojedinělých záznamů a všechny pocházejí až z 21. století. Na polopřirozených biotopech, jakými jsou především suché až mezofilní mezernaté trávníky, byla nalezena v okrajových nebo níže položených partiích vymezeného území: u Brantlova Dvora u Vimperka (Moravec 1965), Lenory, Květušína (Skalický in Kolektiv 1995–1997), Řetenic (Bufková et Sulanová in Kolektiv 1995–1997), Nahořánek (Štech et al. 2021), Rejštejna a Kratušína (Pladias 2021). Zbývající záznamy se vztahují k antropogenním biotopům, kterými jsou především náspy železničních tratí, kam bývá zavlékána z nižších poloh. Na železnici byla nalezena v Loučovicích, Lipce, Alžbětíně a Zelené Lhotě a na luční cestě v osadě Špičák u Železné Rudy (Pladias 2021). Z bavorské strany pohoří je znám jediný blíže nespecifikovaný údaj z roku 1945 z mapovacího pole 6944b, který zaujímá okolí obce Bodenmais (BIB 2021). V rakouské části zaznamenána dosud nebyla (ZOBODAT 2021).

Nejvyšší výskyt: 895 m n. m.

Myosotis ramosissima – Hügel- Vergißmeinnicht

Tato jednoletá pomněnka je rozšířena v Evropě, kromě nejsevernějších oblastí. Na východ zasahuje až po Ural a Kavkaz a na jih až do severní Afriky. Roste především v suchých nezapojených trávnících a na jiných suchých biotopech s řídkou vegetací. Těžiště rozšíření má v teplejších oblastech (Štěpánková 2000, Anonymus 2021, FloraWeb 2021). Na české straně Šumavy existuje o jejím výskytu pouze několik ojedinělých záznamů a všechny pocházejí až z 21. století. Na polopřirozených biotopech, jakými jsou především suché až mezofilní mezernaté trávníky, byla nalezena v okrajových nebo níže položených partiích vymezeného území: u Brantlova Dvora u Vimperka (Moravec 1965), Lenory, Květušína (Skalický in Kolektiv 1995–1997), Řetenic (Bufková et Sulanová in Kolektiv 1995–1997), Nahořánek (Štech et al. 2021), Rejštejna a Kratušína (Pladias 2021). Zbývající záznamy se vztahují k antropogenním biotopům, kterými jsou především náspy železničních tratí, kam bývá zavlékána z nižších poloh. Na železnici byla nalezena v Loučovicích, Lipce, Alžbětíně a Zelené Lhotě a na luční cestě v osadě Špičák u Železné Rudy (Pladias 2021). Z bavorské strany pohoří je znám jediný blíže nespecifikovaný údaj z roku 1945 z mapovacího pole 6944b, který zaujímá okolí obce Bodenmais (BIB 2021). V rakouské části zaznamenána dosud nebyla (ZOBODAT 2021).

Nejvyšší výskyt: 895 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Myosotis ramosissima* – Alena Vydrová – Strašínská jeskyně.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Myosotis ramosissima* – Alena Vydrová – Ovesná.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Myosotis ramosissima* – Alena Vydrová – Ovesná.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY