Salix myrtilloides – vrba borůvkovitá

Vrba borůvkovitá je drobný keř, který se listy a vzrůstem poněkud podobá borůvce a ještě více jí blízce příbuzné vlochyni, se kterou se běžně setkáváme na rašeliništích. Tato vrba roste ve střední Evropě na rašelinných loukách a okrajích rašelinišť, nikoliv ale v živinami velmi chudých vrchovištních rašeliništích, která jsou pro Šumavu charakteristická. Takové lokality odpovídají prostředí v hlavní části areálu v severní Evropě a Asii. Vrba borůvkovitá je tak ve střední Evropě reliktem z konce doby ledové nebo začátku Holocénu (doby poledové). Na Šumavě se vyskytovala velmi vzácně na několika lokalitách na české (Knížecí Pláně, Strážný, Chlum u Volar) i bavorské straně pohoří. Všechny lokality kromě jedné ale již zanikly a v současnosti roste jen na jediném místě na okraji nivy Vltavy u obce Chlum, na ploše pouhých několika metrů čtverečních (Koutecký et al. in Lepší & Lepší 2014). Jde o konkurenčně slabý druh, které je velmi ohrožený změnami na lokalitách (vysoušení a absence kosení nebo pastvy), které vedou k zarůstání statnými ostřicemi a travami nebo vyššími dřevinami. Další ohrožení představuje tzv. genetická eroze, při které se druh kříží s velmi hojnou vrbou ušatou (*S. aurita*). Kříženci se jmenují *S. ×onusta*, byli na lezeni i na Šumavě a jejich současný výskyt u Chlumu je potvrzen.

Salix myrtilloides – Heidelbeer-Weide

Vrba borůvkovitá je drobný keř, který se listy a vzrůstem poněkud podobá borůvce a ještě více jí blízce příbuzné vlochyni, se kterou se běžně setkáváme na rašeliništích. Tato vrba roste ve střední Evropě na rašelinných loukách a okrajích rašelinišť, nikoliv ale v živinami velmi chudých vrchovištních rašeliništích, která jsou pro Šumavu charakteristická. Takové lokality odpovídají prostředí v hlavní části areálu v severní Evropě a Asii. Vrba borůvkovitá je tak ve střední Evropě reliktem z konce doby ledové nebo začátku Holocénu (doby poledové). Na Šumavě se vyskytovala velmi vzácně na několika lokalitách na české (Knížecí Pláně, Strážný, Chlum u Volar) i bavorské straně pohoří. Všechny lokality kromě jedné ale již zanikly a v současnosti roste jen na jediném místě na okraji nivy Vltavy u obce Chlum, na ploše pouhých několika metrů čtverečních (Koutecký et al. in Lepší & Lepší 2014). Jde o konkurenčně slabý druh, které je velmi ohrožený změnami na lokalitách (vysoušení a absence kosení nebo pastvy), které vedou k zarůstání statnými ostřicemi a travami nebo vyššími dřevinami. Další ohrožení představuje tzv. genetická eroze, při které se druh kříží s velmi hojnou vrbou ušatou (*S. aurita*). Kříženci se jmenují *S. ×onusta*, byli na lezeni i na Šumavě a jejich současný výskyt u Chlumu je potvrzen.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

CR (Critically Endangered/Kriticky ohrožené/Vom Aussterben bedroht) [D]

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 08/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

***Salix myrtilloides* – Jana Janáková – Chlum.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Salix myrtilloides* – Jana Janáková – Chlum.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Salix myrtilloides **– Libor Ekrt – Chlum.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Salix myrtilloides* – Petr Koutecký – Chlum, Vltava.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY