Drosera anglica – rosnatka anglická

Cirkumboreálně rozšířený druh, který je ve střední Evropě velmi vzácný a vázaný jen na reliktní lokality otevřených rašelinišť a slatinišť. Na Šumavě je těžiště výskytu na Modravských slatích, kde byla zjištěna na slatích Rokytecké (Weitffalerské), Gayrück, Roklanské, Šárecké, Mlynářské, u Roklanské chaty a Roklanského potoka, na Novohuťské, Blatenské, Březové a Hraniční. V minulosti se také vyskytovala na Medvědí slati, novější údaje odtud chybějí. Na bavorské straně leží pouze jediná lokalita na Zwieselter Filz. Mimo oblast Šumavských plání snad rostla rosnatka anglická v Hornovltavské kotlině. Ze Stráženské slati a od Dolní Borkové pocházejí totiž historické, avšak nedoložené, údaje o výskytu *Drosera ×obovata* (Tannich 1929, 1938; cf. Procházka 2003). Vzhledem k tomu, že se tento kříženec vyskytuje jen na společných lokalitách obou rodičů, je zřejmé, že se zde musela vyskytovat rovněž *D. anglica*. Rosnatka anglická byla také experimentálně vyseta v bývalé pískovně v Novém Údolí. Na rakouské straně Šumavy nebyl tento druh nikdy zaznamenán. Jeho stanovištěm jsou okraje jezírek a šlenků na vrchovištích. Nesnáší konkurenci, upřednostňuje chladnější, vodou dobře zásobená stanoviště s vyšší vzdušnou vlhkostí. Druh je velmi ohrožen destrukcí stanovišť a je velmi citlivý na změny: nesnáší eutrofizaci ani změny vodního režimu, je citlivý k zapojování vegetace. Většina šumavských populací je málopočetná.

Drosera anglica – Langblättriger S.

Cirkumboreálně rozšířený druh, který je ve střední Evropě velmi vzácný a vázaný jen na reliktní lokality otevřených rašelinišť a slatinišť. Na Šumavě je těžiště výskytu na Modravských slatích, kde byla zjištěna na slatích Rokytecké (Weitffalerské), Gayrück, Roklanské, Šárecké, Mlynářské, u Roklanské chaty a Roklanského potoka, na Novohuťské, Blatenské, Březové a Hraniční. V minulosti se také vyskytovala na Medvědí slati, novější údaje odtud chybějí. Na bavorské straně leží pouze jediná lokalita na Zwieselter Filz. Mimo oblast Šumavských plání snad rostla rosnatka anglická v Hornovltavské kotlině. Ze Stráženské slati a od Dolní Borkové pocházejí totiž historické, avšak nedoložené, údaje o výskytu *Drosera ×obovata* (Tannich 1929, 1938; cf. Procházka 2003). Vzhledem k tomu, že se tento kříženec vyskytuje jen na společných lokalitách obou rodičů, je zřejmé, že se zde musela vyskytovat rovněž *D. anglica*. Rosnatka anglická byla také experimentálně vyseta v bývalé pískovně v Novém Údolí. Na rakouské straně Šumavy nebyl tento druh nikdy zaznamenán. Jeho stanovištěm jsou okraje jezírek a šlenků na vrchovištích. Nesnáší konkurenci, upřednostňuje chladnější, vodou dobře zásobená stanoviště s vyšší vzdušnou vlhkostí. Druh je velmi ohrožen destrukcí stanovišť a je velmi citlivý na změny: nesnáší eutrofizaci ani změny vodního režimu, je citlivý k zapojování vegetace. Většina šumavských populací je málopočetná.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

CR (Critically Endangered/Kriticky ohrožené/Vom Aussterben bedroht) [C2a(i)]

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 24/08/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

***Drosera anglica* – Libor Ekrt – Prášily, Stará jímka.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Drosera anglica* – Libor Ekrt – Prášily, Stará jímka.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Drosera anglica* – Petr Koutecký – Blatenská slať.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Drosera anglica* – Petr Koutecký – Hraniční slať.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY