Genista tinctoria – kručinka barvířská

Druh s víceméně evropským areálem, který se táhne od Španělska po Dánsko, v Rusku zasahuje i za Ural, také roste v Turecku a Zakavkazí. V rámci areálu vytváří více morfologicky odchylných typů, zčásti odlišených i ploidní úrovní, hodnocených nejčastěji na úrovni poddruhů. Ve střední Evropě roste běžně od nížin do podhůří. Na Šumavě patří k druhům, které jen nepatrně přesahují vymezené hranice. Byl zaznamenán u Rejštejna, na jihovýchodě u Dolní Sněžné, na několika místech ve vojenském újezdu Boletice (např. u Třebovic a Polné) a taky jižně od Vyššího Brodu; všechny tyto lokality navazují na výskyt v sousedních regionech podhůří. Kromě toho byl u Kubovy Huti a Lenory zjištěn druhotný výskyt. Na bavorské straně existuje několik nálezu na okrajích severozápadní části, v těsné návaznosti na vymezené území byla tato k0.5 ručinka nalezena i v Rakousku. Provází především výslunné suché lesní okraje a prosvětlené listnaté lesy a křoviny, na druhotných stanovištích roste obvykle na okrajích komunikací.

Genista tinctoria – Färber-Ginster

Druh s víceméně evropským areálem, který se táhne od Španělska po Dánsko, v Rusku zasahuje i za Ural, také roste v Turecku a Zakavkazí. V rámci areálu vytváří více morfologicky odchylných typů, zčásti odlišených i ploidní úrovní, hodnocených nejčastěji na úrovni poddruhů. Ve střední Evropě roste běžně od nížin do podhůří. Na Šumavě patří k druhům, které jen nepatrně přesahují vymezené hranice. Byl zaznamenán u Rejštejna, na jihovýchodě u Dolní Sněžné, na několika místech ve vojenském újezdu Boletice (např. u Třebovic a Polné) a taky jižně od Vyššího Brodu; všechny tyto lokality navazují na výskyt v sousedních regionech podhůří. Kromě toho byl u Kubovy Huti a Lenory zjištěn druhotný výskyt. Na bavorské straně existuje několik nálezu na okrajích severozápadní části, v těsné návaznosti na vymezené území byla tato k0.5 ručinka nalezena i v Rakousku. Provází především výslunné suché lesní okraje a prosvětlené listnaté lesy a křoviny, na druhotných stanovištích roste obvykle na okrajích komunikací.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 10/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY