Gymnocarpium robertianum – bukovník vápencový

Bukovník vápencový je cirkumtemperátně rozšířený tetraploidní druh vázaný výhradně na bazická stanoviště. Na Šumavě se jedná o nepůvodní druh osídlující především štěrbiny zdí (s bazickou maltou) na starých budovách případně okraje cest a bývalé vápencové lomy (Ekrt in Kaplan et al. 2018). V celé zájmové oblasti je výskyt bukovníku vápencového znám pouze ojediněle na několika lokalitách. Z Královského hvozdu byl druh zaznamenán na zdi hřbitova v obci Hojsova Stráž (Procházka 1998) a v zídce ve městě Železná Ruda (J. Sofron 1984 PL). Na Šumavských pláních je druh znám ze zdi u obce Keply, na zídce u Roklanské hájenky nedaleko bývalé obce Březník (Nesvadbová & Sofron 1998) a podél cesty od Nové Hůrky na jezero Laka (P. Třísková 1995 PRC). V Hornovltavské kotlině byl druh zaznamenán na hřbitovní zdi v obci Želnava (Procházka 1998) a ve starém vápencovém lomu na JV úpatí Sovího vrchu u bývalé obce Kyselov (Procházka et al. 2001).

Na bavorské straně Šumavy jsou rovněž známy jen adventivní výskyty v údolí řeky Großer Regen. Zatímco výskyty na zdech budov zejména v obcích bývají krátkodobé, výskyty ve starých vápencových lomech jsou stabilnější a trvalejšího charakteru.

Gymnocarpium robertianum – Ruprechtsfarn

Der Ruprechtsfarn ist eine zirkumtemperat verbreitete tetraploide Art, die ausschließlich an basische Standorte gebunden ist. Im Böhmerwald handelt es sich um eine nicht ursprüngliche Art, die vor allem Mauerfugen (mit Kalkmörtel) an alten Gebäuden und Straßenrändern sowie ehemalige Kalksteinbrüche besiedelt (Ekrt in Kaplan et al. 2018). Im gesamten Untersuchungsgebiet ist das Vorkommen des Ruprechtsfarns nur vereinzelt von einigen wenigen Lokalitäten bekannt. Im Künischen Gebirge wurde die Art an der Friedhofsmauer in der Gemeinde Hojsova Stráž (Procházka 1998) und an einer Mauer in Železná Ruda aufgezeichnet (J. Sofron 1984 PL). Auf der Böhmerwald-Hochebene ist die Art von einer Mauer beim Dorf Keply, an der Mauer beim Böhmischen Rachelhaus (Roklanská hájenka) nicht weit von der ehemaligen Ortschaft Březník (Nesvadbová & Sofron 1998) und entlang des Weges von Nová Hůrka zum Lackensee bekannt (P. Třísková 1995 PRC). Im Oberen Moldaubecken wurde die Art an der Friedhofsmauer im Ort Želnava (Procházka 1998) und im alten Kalksteinbruch am südöstlichen Hang des Hügels Soví vrch bei der ehemaligen Ortschaft Kyselov verzeichnet (Procházka et al. 2001). Auch auf Bayerischer Seite sind nur adventiv Fundorte im Tal des Großen Regen bekannt.

Während das Vorkommen an Gebäudemauern insbesondere innerhalb von Ortschaften eher kurzfristig ist, haben die Vorkommen in Kalksteinbrüchen einen stabileren und dauerhafteren Charakter.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NA (Not Applicable/Nevhodné pro hodnocení/Bewertungsungeeignet)

Literatura/Literatur

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018) Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531.

Nesvadbová J. & Sofron J. (1998) Některé výsledky flóristického výzkumu severozápadní části české a bavorské Šumavy. – Zprávy České Botanické Společnosti: 155–159.

Procházka F., Hadinec J. & Havlíček P. (2001) Příspěvek ke květeně české Šumavy a kontaktních území. – Zprávy České botanické společnosti 35: 173–180.

Procházka F. (1998) Novinky šumavské květeny. – Zprávy České Botanické Společnosti 32: 123–136.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 10/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

***Gymnocarpium robertianum* – Milan Štech – Přední Výtoň, Soví vrch.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Gymnocarpium robertianum* – Milan Štech – Přední Výtoň, Soví vrch.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY