Isatis tinctoria – boryt barvířský

Tento teplomilný, původně mediterránní druh je ve střední Evropě považovaný za naturalizovaný archeofyt. Současné výskyty jsou však převážně již neofytního charakteru. Do 18. století byl druh pěstován jako barvířská rostlina, ze které se získávala indigová modř. Boryt barvířský byl na Šumavě zaznamenán zatím pouze jednou v ruderální vegetaci při okraji silnice v obci Slunečná v Hornovltavské kotlině (L. Ekrt 2007 CB). Jde pravděpodobně o zplanění z kultury nebo náhodné zavlečení podél komunikace. Na Šumavě se tedy zřejmě jedná pouze o přechodný výskyt.

Isatis tinctoria – Färber-Waid

Diese wärmeliebende, ursprünglich mediterrane Art wird in Mitteleuropa als eingebürgerter Archäophyt betrachtet. Das gegenwärtige Vorkommen hat jedoch eher Neophyten-Charakter. Bis zum 18. Jahrhundert wurde die Art als Färberpflanze angebaut, aus der Indigoblau gewonnen wurde. Der Färber-Waid wurde im Böhmerwald bisher nur einmal in ruderaler Vegetation am Straßenrand im Ort Slunečná im Oberen Moldaubecken nachgewiesen (L. Ekrt 2007 CB). Es handelt sich wahrscheinlich um eine Verwilderung aus der Kultur oder eine zufällige Einschleppung entlang der Straße. Für den Böhmerwald stellt es wahrscheinlich nur ein unbeständiges Vorkommen dar.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NA (Not Applicable/Nevhodné pro hodnocení/Bewertungsungeeignet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 08/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

***Isatis tinctoria* – Libor Ekrt – Želnava, Slunečná.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Isatis tinctoria* – Libor Ekrt – Želnava, Slunečná.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY