Melampyrum nemorosum – černýš hajní

Teplomilný poloparazitický druh, který na Šumavu proniká z podhůří především v jihovýchodní závětrné a nejteplejší části území. Roste zde v lesních lemech, křovinách a na okrajích luk. Častým hostitelským druhem je pak líska. Zatímco v tomto území vystupuje až nad 900 m nad mořem, na návětrné straně Šumavy v Bavorsku jeho výskyt zasahuje jen do 750 m n. m. (Vollmann 1914).

Nejvyšší výskyt: 950 m n. m.

Melampyrum nemorosum – Hain-Wachtelweizen

Eine wärmeliebende halbparasitische Art, die in den Böhmerwald aus dem Vorgebirge vor allem im südöstlichen windabgewandten und wärmsten Teil des Gebietes vordringt. Der Hain-Wachtelweizen wächst hier an Waldsäumen, Hecken und Wiesenrändern. Wirtsart ist häufig die Hasel. Während er in diesem Gebiet bis auf über 900 m hochsteigt, erreicht sein Vorkommen auf der Wetterseite des Böhmerwaldes in Bayern nur eine Meereshöhe von 750 m (Vollmann 1914).

Nejvyšší výskyt: 950 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes


NA (Not Applicable/Nevhodné pro hodnocení/Bewertungsungeeignet)

Literatura/Literatur

Vollmann F. (1914) Flora von Bayern. – 840 p., Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Stuttgart.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY