Persicaria mitis – rdesno řídkokvěté

Rdesno řídkokvěté nejčastěji roste na mokrých místech na lesních cestách a dalších narušovaných místech (paseky apod.), méně často na březích vod, na stinných ruderálních místech a vzácně jako plevel ve vlhkých polích. Vyskytuje se převážně v nižších polohách a vyhýbá se silně kyselým půdám. Na Šumavě se vyskytuje zřídka v bavorské části pohoří, kde navazuje na roztroušený výskyt v podhůří a Podunají. Naopak z rakouské a české části Šumavy nebyl tento druh dosud doložen a velmi vzácný je i v navazující části jižních a jihozápadních Čech.

Persicaria mitis – Milder Knöterich

Rdesno řídkokvěté nejčastěji roste na mokrých místech na lesních cestách a dalších narušovaných místech (paseky apod.), méně často na březích vod, na stinných ruderálních místech a vzácně jako plevel ve vlhkých polích. Vyskytuje se převážně v nižších polohách a vyhýbá se silně kyselým půdám. Na Šumavě se vyskytuje zřídka v bavorské části pohoří, kde navazuje na roztroušený výskyt v podhůří a Podunají. Naopak z rakouské a české části Šumavy nebyl tento druh dosud doložen a velmi vzácný je i v navazující části jižních a jihozápadních Čech.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Persicaria mitis* – Milan Štech – Lohberg.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY