

## ***Pteridium aquilinum* – hasivka orličí**

Hasivka orličí je vytrvalým expanzně se šířícím kosmopolitně rozšířeným druhem. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně až místy hojně v nižších a středních polohách. Častý výskyt hasivky orličí byl pozorován zpravidla v říčních údolích Otavy, Vydry, Křemelné, Studené Vltavy, Losenice, Úhlavy. Naopak do vyšších poloh zasahuje jen okrajově a v centrálních partiích Šumavských plání je velmi vzácná až chybí stejně jako v prostoru mezi obcemi Strážný, České Žleby a Lenora na české straně a obcemi Finsterau, Annathal na německé straně Šumavy. Jedná se o významný rychle rostoucí druh tvořící často rozsáhlé porosty ve světlých acidofilních lesích, lesních okrajích, na mezích, na světlínách podél toků a komunikací a na neobhospodařovaném bezlesí. S větší četností se může vyskytovat v prostoru bývalých obcí na historických pastvinách a v podrostu náletových dřevin. Porosty hasivky orličí bývají převážně sterilní, pouze ojediněle byly v území zaznamenány fertilní porosty a to u obcí Hojsova Stráž, Železná Ruda, Kašperské Hory, Srní, Pernek a Loučovice (Ekrt & Podroužek in Kaplan et al. 2018). Populace hasivky orličí bývají v Evropě převážně diploidní, pouze vzácně se mohou vyskytovat populace triploidní nebo směsné. Na Šumavě byl zaznamenán výskyt triploidních rostlin zatím pouze v údolí Vltavy u Loučovic (Ekrt et al. 2021).

Nejvyšší výskyt: 1350 m n. m.

## ***Pteridium aquilinum* – Gewöhnlicher Adlerfarn**

Hasivka orličí je vytrvalým expanzně se šířícím kosmopolitně rozšířeným druhem. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně až místy hojně v nižších a středních polohách. Častý výskyt hasivky orličí byl pozorován zpravidla v říčních údolích Otavy, Vydry, Křemelné, Studené Vltavy, Losenice, Úhlavy. Naopak do vyšších poloh zasahuje jen okrajově a v centrálních partiích Šumavských plání je velmi vzácná až chybí stejně jako v prostoru mezi obcemi Strážný, České Žleby a Lenora na české straně a obcemi Finsterau, Annathal na německé straně Šumavy. Jedná se o významný rychle rostoucí druh tvořící často rozsáhlé porosty ve světlých acidofilních lesích, lesních okrajích, na mezích, na světlínách podél toků a komunikací a na neobhospodařovaném bezlesí. S větší četností se může vyskytovat v prostoru bývalých obcí na historických pastvinách a v podrostu náletových dřevin. Porosty hasivky orličí bývají převážně sterilní, pouze ojediněle byly v území zaznamenány fertilní porosty a to u obcí Hojsova Stráž, Železná Ruda, Kašperské Hory, Srní, Pernek a Loučovice (Ekrt & Podroužek in Kaplan et al. 2018). Populace hasivky orličí bývají v Evropě převážně diploidní, pouze vzácně se mohou vyskytovat populace triploidní nebo směsné. Na Šumavě byl zaznamenán výskyt triploidních rostlin zatím pouze v údolí Vltavy u Loučovic (Ekrt et al. 2021).


Nejvyšší výskyt: 1350 m n. m.

## **Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes**

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

## **Literatura/Literatur**

## Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 10/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

## Fotografie/Fotos



*Pteridium aquilinum* – Libor Ekrť – Paště.



Europäische Union  
Evropská unie  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES  
BÖHMERWALDES



KVĚTENA  
ŠUMAVY



***Pteridium aquilinum* – Libor Ekrt – Paště.**



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

