

***Aegopodium podagraria* – bršlice kozí noha**

Nitrofilní druh, který roste na vlhčích půdách, zejména na březích potoků, okrajích lesů, loukách, v křovinách, příkopech, trávnicích v obcích a v mnohých dalších živinami bohatých stanovištích. V nižších a středních polohách Šumavy je zcela běžným druhem, ve vyšších polohách roste především na antropogenních stanovištích, typicky podél cest a v místech starých usedlostí. Vzácněji je zavlékán až do nejvyšších poloh.

***Aegopodium podagraria* – Giersch**

Eine nitrophile Art, die auf feuchteren Böden, insbesondere an Bachufern, an Waldrändern, in Hecken, an Gräben, auf Grünflächen in Dörfern und auf vielen weiteren nährstoffreichen Standorten wächst. In niedrigeren und mittleren Lagen des Böhmerwaldes ist der Gewöhnliche Giersch eine weit verbreitete Art, in höheren Lagen wächst er vor allem auf anthropogenen Standorten, typischerweise entlang von Wegen und an alten Hofstellen. Bis in die höchsten Lagen wird er selten verschleppt.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur




**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 09/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Fotografie/Fotos



Aegopodium podagraria – Iva Buřková – Prášily, Velký Bor.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ / Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)





© Milan Štech

Aegopodium podagraria – Milan Štech – Bližná.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY



***Aegopodium podagraria* – Alena Lepší – Pěkná.**



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj




Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY



© Alena Lepší

Aegopodium podagraria – Alena Lepší – Pěkná.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)


**FLORA DES
BÖHMERWALDES**