Carex magellanica subsp. irrigua – ostřice vrchovištní zaplavovaná

Velmi významný boreomontánní taxon, jehož rozšíření na Šumavě je soustředěno na rašeliniště Šumavských plání, kde existuje několik desítek lokalit, např. u Skelné, Prášil nebo Srní, na Modravských, Kvildských a Zhůřských slatích, na Chalupské slati u Borových Lad atd. (Procházka & Kováříková 1999). Druh na Šumavských pláních roste i na rašelinných loukách (např. asi 300 m jižně až jihovýchodně od Prášil či 1,4 km jižně Kvildy) nebo v rašelinných smrčinách (např. na západních svazích Mokrůvek, severovýchodně Kamerální slati nebo severovýchodně Novohuťských močálů).

Druh se na podobných stanovištích vyskytuje i v přiléhající části Bavorska. Jsou to vrchoviště Zwieswelter Filz, Latschenfilz, „Alter See“ jižně jezera Rachelsee, Großer Filz na bavorské straně vrchu Špičník, Stangenfilz a Kleiner Kainzen-Filz, přechodových rašeliništích v pramenných oblastech potoků Wildauerbach a Großen Schwarzbachs, a také na plovoucích ostrůvcích obou Javorských jezer (Arberseen).

V blatkovém boru jihovýchodně Skelné, v nadmořské výšce 810 m se nachází nejníže položená lokalita na Šumavě (Řepka & Lustyk 1998).

Údaj o výskytu na Rakouské louce v hřebenových partiích Trojmezenské hornatiny (Albrecht in Procházka & Štech 2002) vznikl pravděpodobně záměnou s *C. limosa. (Grulich in Lepší et al. 2013).

Carex magellanica subsp. irrigua – Riesel-Segge

Sehr bedeutende boreomontane Sippe, deren Verbreitung sich im Böhmerwald auf die Moore der Böhmerwald-Hochbene konzentriert. Dort gibt es einige Dutzend Wuchsorte, z. B. bei Skelná, Prášily oder Srní, auf den Filzen bei Modrava, Kvilda und Zhůří, im Chalupská slať bei Borová Lada usw. (Procházka & Kováříková 1999). Auf der Böhmerwald-Hochebene wächst die Art auch auf Moorwiesen (z. B. ca. 300 m südlich bis südöstlich von Prášily oder 1,4 km südlich von Kvilda) und in Moorfichtenwäldern (z. B. auf den Westhängen der Mokrůvky, nordöstlich des Kamerální slať oder nordöstlich des Novohuťské močály).

Die Art kommt auf ähnlichen Standorten auch im anliegenden Teil Bayerns vor. Es sind dies die Hochmoore Zwieselter Filz, Latschenfilz, „Alter See“ südl. des Rachelsees, Großer Filz am Großen Spitzberg, Stangenfilz und Kleiner Kainzen-Filz, die Quellmoore im Ursprungsgebiet des Wildauer Bachs und des Großen Schwarzbachs sowie die Schwingrasen an beiden Arberseen.

Der am tiefsten liegende Standort in der Tschechischen Republik und im gesamten Böhmerwald befindet sich im Haken-Kieferwald südöstlich von Skelná, 810 m ü. NHN (Řepka & Lustyk 1998).

Bei der Angaben eines Vorkommens auf der Rakouská louka Wiese im Kammbereich des Plöckensteins (Albrecht in Procházka & Štech 2002) handelt es sich wahrscheinlich um eine Verwechslung mit *C. limosa*. (Grulich in Lepší et al. 2013).

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

EN (Endangered/Ohrožené/Stark gefährdet) [B2b(iii)c(iv)]

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 11/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

***Carex magellanica subsp. irrigua* – Libor Ekrt – Horská Kvilda.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Carex magellanica subsp. irrigua* – Libor Ekrt – Horská Kvilda.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Carex magellanica subsp. irrigua* – Milan Štech – Kvildský les.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Carex magellanica subsp. irrigua* – Alena Vydrová – Chalupská slať.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Carex magellanica subsp. irrigua* – Petr Koutecký – Moorberg.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY