Centaurea jacea – chrpa luční

Druh mezofilních luk a travnatých lesních okrajů, poměrně hojný v nižších částech Šumavy do nadmořské výšky asi 800 m, výjimečně až do 1000 m. Vyskytuje se také v travnaté vegetaci podél cest, mezí, v trávnících uvnitř sídel (i intenzivně kosených), vzácněji i podél lesních cest a na pasekách. Ačkoliv optimum má v kosených loukách, přežívá dlouhodobě i na nekosených plochách. Z několika rozeznávaných poddruhů na Šumavě roste pouze chrpa luční pravá (*C. jacea* subsp. *jacea*).

Centaurea jacea – Wiesen-Flockenblume

Diese Art mesophiler Wiesen und grasiger Waldränder ist ziemlich häufig in den niedrig gelegenen Teilen des Böhmerwaldes unter etwa 800 m ü. d. M., ausnahmsweise bis 1000 m ü. d. M. Sie kommt auch in der grasigen Vegetation entlang von Wegen, Rainen, in (auch intensiv gemähten) Rasen innerhalb von Siedlungen, seltener auch entlang von Waldwegen und auf Lichtungen vor. Obwohl sie optimale Bedingungen auf gemähten Wiesen findet, überlebt sie auch auf nicht gemähten Flächen lange. Von einigen unterschiedenen anerkannten Unterarten wächst im Böhmerwald nur die Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume (*C. jacea* subsp. *jacea*).

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 10/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

***Centaurea jacea* – Milan Štech – Olšina.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Centaurea jacea* – Milan Štech – Olšina.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY