Crataegus ×macrocarpa – hloh velkoplodý

Jménem hloh velkoplodý jsou označovány intermediární morfotypy vzniklé hybridizací mezi h. obecným (*C. laevigata*) a h. křivokališným (*C. rhipidophylla*). Areál tohoto hybridogenního taxonu není přesně znám. Údaje o jeho rozšíření pocházejí ze střední Evropy, na západ zasahuje do Belgie a severní Francie, na sever do jižní Skandinávie, na jih po Švýcarsko a severní Itálii a na východ po Slovensko (Holub 1992). Na Šumavě se vyskytuje podobně jako většina ostatních hlohů vzácně v okrajových nejníže položených partiích. Společně s h. jednosemenným (*C. monogyna*) představují nejhojnější zástupce hlohů na Šumavě. Roste v křovinatých okrajích lesů, remízů, luk, pastvin a cest a místy zarůstá opuštěné kulturní bezlesí. Z bavorské části vymezeného území existuje pouze několik blíže nespecifikovaných záznamů z poloviny 20. století (BIB 2021), zatímco z Rakouska existují nedávné údaje od sídel Lichtenberg, Hintenberg, Diendorf, Schönegg, Weigetschlag (ZOBODAT 2021). Vzhledem k možným determinačním omylům jsou z české strany pohoří níže uvedeny pouze údaje, které byly ověřeny stanovením tetraploidního stupně průtokovým cytometrem nebo byly dokladovány herbářovou položkou. Takové záznamy byly pořízeny u Hořejšího Těšova na Plánickém hřebeni, u Kašperských Hor v Horním Pootaví, u Tejmlova na Javorníku, u osady Škarez v Prachatickém Předšumaví, u Albrechtovic v Libínském Předšumaví, v okolí Květušína ve Chvalšinském a Českokrumlovském Předšumaví a u Pasečné ve Svatotomášské hornatině (leg. M. Lepší et J. Velebil 2021 CB). Vzácně byly v území detekovány triploidní rostliny morfologicky blízké převažujícímu tetraploidnímu cytotypu, které jsou zřejmě produktem lokální hybridizace mezi diploidními a tetraploidními taxony. Tetraploidní cytotyp zde označovaný jménem *C. ×macrocarpa* vykazuje na Šumavě malou morfologickou variabilitu, což nasvědčuje apomiktickému rozmnožování.

Crataegus ×macrocarpa – Großfrüchtiger Weißdorn

Jménem hloh velkoplodý jsou označovány intermediární morfotypy vzniklé hybridizací mezi h. obecným (*C. laevigata*) a h. křivokališným (*C. rhipidophylla*). Areál tohoto hybridogenního taxonu není přesně znám. Údaje o jeho rozšíření pocházejí ze střední Evropy, na západ zasahuje do Belgie a severní Francie, na sever do jižní Skandinávie, na jih po Švýcarsko a severní Itálii a na východ po Slovensko (Holub 1992). Na Šumavě se vyskytuje podobně jako většina ostatních hlohů vzácně v okrajových nejníže položených partiích. Společně s h. jednosemenným (*C. monogyna*) představují nejhojnější zástupce hlohů na Šumavě. Roste v křovinatých okrajích lesů, remízů, luk, pastvin a cest a místy zarůstá opuštěné kulturní bezlesí. Z bavorské části vymezeného území existuje pouze několik blíže nespecifikovaných záznamů z poloviny 20. století (BIB 2021), zatímco z Rakouska existují nedávné údaje od sídel Lichtenberg, Hintenberg, Diendorf, Schönegg, Weigetschlag (ZOBODAT 2021). Vzhledem k možným determinačním omylům jsou z české strany pohoří níže uvedeny pouze údaje, které byly ověřeny stanovením tetraploidního stupně průtokovým cytometrem nebo byly dokladovány herbářovou položkou. Takové záznamy byly pořízeny u Hořejšího Těšova na Plánickém hřebeni, u Kašperských Hor v Horním Pootaví, u Tejmlova na Javorníku, u osady Škarez v Prachatickém Předšumaví, u Albrechtovic v Libínském Předšumaví, v okolí Květušína ve Chvalšinském a Českokrumlovském Předšumaví a u Pasečné ve Svatotomášské hornatině (leg. M. Lepší et J. Velebil 2021 CB). Vzácně byly v území detekovány triploidní rostliny morfologicky blízké převažujícímu tetraploidnímu cytotypu, které jsou zřejmě produktem lokální hybridizace mezi diploidními a tetraploidními taxony. Tetraploidní cytotyp zde označovaný jménem *C. ×macrocarpa* vykazuje na Šumavě malou morfologickou variabilitu, což nasvědčuje apomiktickému rozmnožování.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY